

UVEÍTIS • QUERATITIS • VASCULITIS RETINIANA Y OTRAS AFECCIONES OCULARES INFLAMATORIAS

El alivio es posible con Acthar® Gel

Pregunte a su médico si Acthar Gel, aprobado por la FDA, puede ser adecuado para usted



Gerolyn, tratada con Acthar Gel. Los resultados individuales pueden variar.

¿Qué es Acthar Gel?

Acthar es un medicamento de venta con receta para afecciones alérgicas e inflamatorias graves agudas y crónicas que afectan a diferentes partes del ojo. Puede incluir la parte frontal del ojo, como la córnea y el iris, o la parte posterior del ojo, como el nervio óptico y la retina. Acthar se inyecta debajo de la piel o en el músculo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

NO USE Acthar hasta haber hablado con su médico si se da alguna de las siguientes afecciones:

- Ha recibido o está a punto de recibir una vacuna de virus vivos o de virus vivos atenuados
- Padece una enfermedad de la piel llamada esclerodermia
- Tiene pérdida de densidad ósea u osteoporosis
- Presenta cualquier infección, ya sea por hongos, bacteriana o viral

Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.

Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

¿Podría ser Acthar® Gel adecuado para usted?

Acthar Gel es un medicamento aprobado por la FDA que puede ayudarlo si aún busca alivio de los síntomas.

Acthar Gel no es un esteroide. Se cree que Acthar Gel **actúa de forma diferente a los esteroides**, pero pueden tener efectos secundarios similares en algunas personas. Hable con su médico sobre lo que debe esperar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

NO USE Acthar hasta haber hablado con su médico si tiene alguna de las siguientes afecciones (continuación):

- Tiene infecciones en los ojos, como el herpes simple ocular
- Lo han operado recientemente
- Tiene úlceras de estómago o antecedentes de úlceras de estómago
- Padece insuficiencia cardíaca
- Tiene presión sanguínea alta no controlada

Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.

2

Es posible que pueda **ver resultados** con **Acthar Gel** para su afección ocular

Denise, tratada con Acthar Gel. Los resultados individuales pueden variar.

Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

3

En este folleto, encontrará información sobre:

Síntomas de afecciones oculares inflamatorias 6

¿Qué es **Acthar® Gel**? 8

Qué tan bien funcionó Acthar Gel en personas con uveítis, queratitis y vasculitis retiniana 10

Maneras de usar Acthar Gel 16

Su **equipo de apoyo** 18

Cómo iniciar una conversación con su médico 20

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

NO USE Acthar hasta haber hablado con su médico si tiene alguna de las siguientes afecciones (continuación):

- Padece la enfermedad de Addison o el síndrome de Cushing
- Es alérgico a las proteínas derivadas del cerdo
- Existe sospecha de infecciones congénitas (en los niños menores de 2 años)

Informe a su médico acerca de cualquier otro problema de salud que tenga. Entregue a su médico una lista completa de los medicamentos que está tomando, tanto los de venta con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales.

4 Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.



Hable con su médico para saber si **Acthar Gel** es adecuado para usted

No es un paciente real.

Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

5

¿Tiene dificultades con estos síntomas frecuentes de su afección inflamatoria?

	UVEÍTIS	QUERATITIS	VASCULITIS RETINIANA
Visión borrosa	✓	✓	✓
Enrojecimiento de los ojos	✓	✓	
Miodesopsias	✓		✓
Dolor ocular	✓	✓	
Sensibilidad a la luz	✓	✓	
Disminución de la visión		✓	✓
Lagrimeo		✓	
Dificultad para abrir el párpado		✓	

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar?

- Nunca inyecte Acthar directamente en vena
- Acthar se inyecta debajo de la piel o en el músculo. Inyecte siempre Acthar con SelfJect debajo de la piel.
- Siga las instrucciones de su médico para las inyecciones de Acthar


Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.

Pregunte a su médico sobre Acthar® Gel

Acthar Gel puede **aliviar los síntomas de su afección ocular inflamatoria.**

¿Qué es Acthar® Gel?

Acthar Gel es un medicamento de venta con receta para afecciones alérgicas e inflamatorias graves agudas y crónicas que afectan a diferentes partes del ojo. Puede incluir la parte frontal del ojo, como la córnea y el iris, o la parte posterior del ojo, como el nervio óptico y la retina.



John, tratado con Acthar Gel. Los resultados individuales pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- Nunca deje el tratamiento de repente, a menos que se lo indique su médico
- Intente no saltarse ninguna de las citas programadas con el médico. Es importante que le hagan revisiones médicas mientras esté en tratamiento con Acthar

Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.

8

¿Cómo se cree que actúa Acthar Gel?

- No **es un esteroide**. Se cree que Acthar Gel actúa de manera diferente a los esteroides
- Se cree que actúa con el sistema inmunitario para ayudar a **reducir la inflamación**
- Es una combinación de **proteínas y hormonas naturales**, como las que ya se encuentran en el cuerpo.

No se comprende por completo cómo actúa Acthar Gel. Se están realizando más estudios. La información anterior se basa en estudios realizados en laboratorios y con voluntarios sanos. Se desconoce cómo se relaciona la información con los beneficios para el paciente. Acthar Gel puede tener efectos secundarios similares a los de los esteroides. Pregúntele a su médico qué debe esperar del tratamiento con Acthar.

- Es posible que usted sea más propenso a contraer infecciones nuevas. Además, las infecciones antiguas pueden volverse activas. Informe a su médico si observa algún signo de infección. Comuníquese con su médico cuando observe el primer signo de infección o fiebre. Los signos de infección son fiebre, tos, vómitos o diarrea. Otros signos pueden ser los de la influenza o gripe, o cualquier cortadura abierta o llaga

Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

9

¿Qué tan bien funcionó Acthar® Gel en personas con uveítis?

En un estudio, los médicos revisaron los registros médicos para comprobar si Acthar Gel era eficaz en el tratamiento de personas con uveítis. Se incluyeron los registros de **91 personas** que usaron Acthar Gel en los últimos **12 meses**.

En este estudio:



4 de cada 5 personas experimentaron **mejora de los síntomas***



3 de cada 4 personas **dejaron de recibir otros tratamientos** después de 3 meses de **usar Acthar Gel**

*Los médicos calificaron los síntomas de uveítis como mejorados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- Con el tratamiento prolongado de Acthar las glándulas suprarrenales pueden producir cantidades excesivas de una hormona llamada cortisol. Esto puede provocar síntomas del síndrome de Cushing. Esto puede provocar un aumento de la grasa en la parte superior del cuerpo, cara redondeada “cara de luna llena”, formación de moretones con facilidad o debilidad muscular
- A veces, al dejar de recibir un tratamiento prolongado con Acthar, el organismo no fabrica suficiente cortisol natural. Esto se denomina “insuficiencia suprarrenal”. Su médico puede recetar un medicamento esteroide para protegerlo hasta que la glándula suprarrenal se recupere

Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.

10

Las personas experimentaron mejoras en los siguientes síntomas:



Visión



Dolor ocular



Destellos de luz en el ojo (destellos vítreos)[†]



Observación de miosesopsias (turbidez vítrea)[†]

No se estudió la seguridad de Acthar Gel. Recuerde que Acthar Gel puede tener efectos secundarios similares a los que puede experimentar con los esteroides.

Hubo limitaciones a este estudio, incluida la posibilidad de que los registros médicos estuvieran incompletos y de que los médicos tuvieran definiciones distintas de “mejora”. Muchas personas estaban recibiendo otros tratamientos junto con Acthar Gel. Se desconoce el papel exacto que tuvo Acthar Gel en las mejoras.

[†]El humor vítreo es el material gelatinoso que se encuentra en el medio del ojo.

- Puede desarrollar presión arterial alta, retener demasiados líquidos y sal o tener bajos los niveles de potasio en sangre. Como resultado de esto, su médico puede recomendar algún cambio en su dieta, como comer menos sal o usar ciertos suplementos

Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

11

¿Qué tan bien funcionó Acthar® Gel en personas con queratitis?

Un estudio analizó si Acthar Gel era seguro y eficaz en el tratamiento de personas con queratitis grave. En el estudio participaron **31 personas** que usaron Acthar Gel durante **16 semanas**.*

En este estudio:



1 de cada 2

personas **experimentó mejoras** después de 12 semanas de tratamiento con **Acthar Gel**

*Se registraron los cambios en los síntomas de 34 personas después de 12 semanas.

Hubo límites para este estudio relativamente pequeño y más corto. Las personas podrían haber estado recibiendo otros tratamientos junto con Acthar Gel. Se desconoce el papel exacto que tuvo Acthar Gel en las mejoras.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- Las vacunas pueden no funcionar bien durante el tratamiento con Acthar. Hable con su médico sobre las vacunas que son seguras cuando se está en tratamiento con Acthar
- Acthar puede ocultar los síntomas de otras enfermedades. Esto puede hacer que sea más difícil para su médico hacer un diagnóstico si sucede alguna otra cosa

Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.

Las personas experimentaron mejoras en los siguientes síntomas:



Ojos secos



Ardor o escozor en los ojos



Picazón en los ojos

Doce pacientes informaron al menos 1 evento médico que no estaba presente al inicio del tratamiento. Algunos de estos incluyeron presión arterial alta, visión borrosa, visión doble e irritabilidad. Una persona informó un evento médico grave (sobredosis intencional) que no estuvo relacionado con el tratamiento con Acthar Gel. Los médicos que realizaron el estudio no observaron ningún aumento notable en la presión ocular.

- Problemas de estómago o intestinales. Acthar puede aumentar el riesgo de sangrado y úlceras estomacales. Informe a su médico si tiene dolor estomacal, vómitos con sangre, heces oscuras o con sangre, cansancio excesivo, aumento de la sed, dificultad para respirar o aumento de la frecuencia cardíaca

¿Qué tan bien funcionó Acthar® Gel en personas con vasculitis retiniana?

Un estudio analizó si Acthar Gel era eficaz en el tratamiento de personas con vasculitis retiniana. Participaron **18 personas** que usaron Acthar Gel durante **24 semanas**.

En este estudio:



3 de cada 5

personas **experimentaron mejoras** después del tratamiento con **Acthar Gel**

Algunos pacientes experimentaron efectos secundarios que no estaban presentes antes de usar Acthar Gel, como insomnio, palpitaciones, cambios de humor, reacciones en el lugar de la inyección, cambios en el apetito e hipertensión. Un paciente interrumpió su participación en el estudio debido a efectos adversos. Los médicos que realizaron el estudio no observaron ningún aumento notable en la presión ocular.

Hubo límites para este estudio, incluido el hecho de que las personas podrían haber estado recibiendo otros tratamientos junto con Acthar Gel. Se desconoce el papel exacto que tuvo Acthar Gel en las mejoras.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.

14

Escuche la experiencia de **Brenda** con **Acthar Gel**



Visite [Acthar.com/patient-stories](https://www.acthar.com/patient-stories).

Brenda, tratada con Acthar Gel. Los resultados individuales pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- El uso de Acthar puede hacer que esté irritable o deprimido. También puede tener cambios en el estado de ánimo o problemas para dormir. Estos efectos son reversibles una vez que se interrumpe el tratamiento con Acthar
- Si tiene otras dolencias, como por ejemplo diabetes o debilidad muscular, puede notar que empeoran
- Usted podría desarrollar ciertas afecciones oculares, como cataratas, glaucoma o daño en el nervio óptico

Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

15

¿Cómo puede usar Acthar® Gel?

Acthar Gel se puede usar de **2 formas**. Hable con su médico para saber cuál es la mejor forma para usted.

Inyector SelfJect™ precargado con Acthar® Gel de dosis única

Un dispositivo diseñado para ayudar a las personas a usar una dosis de 40 u 80 unidades de Acthar Gel debajo de la piel (por vía subcutánea). Puede ser útil para las personas que tienen deterioro de la visión o problemas de agarre.

SelfJect solo debe ser administrado por personas de 18 años de edad o más.



INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- Su cuerpo puede desarrollar alergias a Acthar; estas alergias pueden ser graves. Los signos de reacción alérgica incluyen:
 - o Sarpullido y picazón en la piel
 - o Dificultad para respirar
 - o Hinchazón de la cara, la lengua, los labios o la garganta

Consulte la **Información de prescripción completa adjunta** y las **Instrucciones de uso de SelfJect de 40 y 80 unidades**. Si le han recetado SelfJect, consulte la **Guía de referencia rápida en la caja de SelfJect**.

16

¿Es la primera vez que se inyecta?

No se preocupe, un enfermero educador le proporcionará la **capacitación** sobre la inyección **que necesite**, ya sea en su hogar, en línea o por teléfono.

Vial y jeringa

Una opción para las personas que toman cualquier dosis de Acthar Gel. El vial y la jeringa se pueden usar para inyectar debajo de la piel o en un músculo (vía intramuscular).



Acthar Gel se inyecta en la parte superior del muslo, el abdomen o la parte posterior del brazo. Evite inyectar a menos de 1 pulgada del ombligo, la rodilla o la zona de la ingle. NO se inyecta en el ojo.

- Los efectos de Acthar pueden intensificarse cuando se tiene hipotiroidismo o cirrosis hepática
- El uso prolongado de Acthar puede afectar el crecimiento y el desarrollo físico de los niños. Esto puede revertirse cuando Acthar ya no es necesario

Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

17

Apoyo desde el principio

Si Acthar® Gel es adecuado para usted, el **Servicio de Apoyo al Paciente de Acthar** está aquí para ayudarlo en su plan de tratamiento.

Usted queda automáticamente inscrito en el **Servicio de Apoyo al Paciente de Acthar** cuando su médico le envía la receta. El programa de apoyo ayuda a **navegar por la cobertura del seguro** y a **capacitarse en la aplicación de inyecciones**.




Miembro del equipo de apoyo

El Servicio de Apoyo al Paciente de Acthar proporcionará:



Un **enfermero Guía** que lo acompañará durante todo el tiempo que tome Acthar Gel y que podrá responder a sus preguntas y proporcionarle apoyo*



Capacitación gratuita para colocar inyecciones, según sus necesidades



Apoyo en cuestiones de cobertura de seguro. Su **administrador de casos** está listo para ayudarlo a revisar sus opciones y crear un plan

No comenzará este recorrido de atención solo

Cuenta con un equipo de atención dedicado disponible para apoyarlo en cada paso del camino.

*El personal de enfermería en función de guía no proporciona asesoramiento médico y lo derivará a su proveedor de atención médica por cualquier pregunta relacionada con el tratamiento, incluidas otras derivaciones.

Comience hoy mismo la conversación acerca del uso de Acthar® Gel con su médico

Usted y su médico pueden **trabajar juntos** para decidir si Acthar Gel es el tratamiento adecuado para usted. Estas son algunas **preguntas** que lo ayudarán a iniciar la conversación:

- ¿Es Acthar Gel una opción de tratamiento adecuada para mi afección?
- ¿Qué efectos secundarios han experimentado sus pacientes mientras recibían Acthar Gel?
- ¿Qué beneficios han experimentado sus pacientes al usar Acthar Gel?

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- Acthar puede causar osteoporosis (huesos débiles)
- Acthar puede dañar al bebé no nacido. Por lo tanto, informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada

20

Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.



Sea un miembro **activo** de su **equipo de atención**

No es una paciente real.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de Acthar?

Efectos secundarios de Acthar que se reportan con frecuencia son:

- Reacción en el lugar de la inyección
- Cansancio, debilidad física y falta de energía
- Retención de líquidos
- Insomnio (dificultad para dormir)
- Dolor de cabeza
- Azúcar en la sangre alta

Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

21

Hable con su médico

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

NO USE Acthar hasta haber hablado con su médico si se da alguna de las siguientes afecciones:

- Ha recibido o está a punto de recibir una vacuna de virus vivos o de virus vivos atenuados
- Padece una enfermedad de la piel llamada esclerodermia
- Tiene pérdida de densidad ósea u osteoporosis
- Presenta cualquier infección, ya sea por hongos, bacteriana o viral
- Tiene infecciones en los ojos, como el herpes simple ocular
- Lo han operado recientemente
- Tiene úlceras de estómago o antecedentes de úlceras de estómago
- Padece insuficiencia cardíaca
- Tiene presión sanguínea alta no controlada
- Padece la enfermedad de Addison o el síndrome de Cushing
- Es alérgico a las proteínas derivadas del cerdo
- Existe sospecha de infecciones congénitas (en los niños menores de 2 años)

Informe a su médico acerca de cualquier otro problema de salud que tenga. Entregue a su médico una lista completa de los medicamentos que está tomando, tanto los de venta con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales.

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar?

- Nunca inyecte Acthar directamente en vena
- Acthar se inyecta debajo de la piel o en el músculo. Inyecte siempre Acthar con SelfJect debajo de la piel
- Siga las instrucciones de su médico para las inyecciones de Acthar

- Nunca deje el tratamiento de repente, a menos que se lo indique su médico
- Intente no saltarse ninguna de las citas programadas con el médico. Es importante que le hagan revisiones médicas mientras esté en tratamiento con Acthar
- Es posible que usted sea más propenso a contraer infecciones nuevas. Además, las infecciones antiguas pueden volverse activas. Informe a su médico si observa algún signo de infección. Comuníquese con su médico cuando observe el primer signo de infección o fiebre. Los signos de infección son fiebre, tos, vómitos o diarrea. Otros signos pueden ser los de la influenza o gripe, o cualquier cortadura abierta o llaga
- Con el tratamiento prolongado de Acthar las glándulas suprarrenales pueden producir cantidades excesivas de una hormona llamada cortisol. Esto puede provocar síntomas del síndrome de Cushing. Esto puede provocar un aumento de la grasa en la parte superior del cuerpo, cara redondeada “cara de luna llena”, formación de moretones con facilidad o debilidad muscular
- A veces, al dejar de recibir un tratamiento prolongado con Acthar, el organismo no fabrica suficiente cortisol natural. Esto se denomina “insuficiencia suprarrenal”. Su médico puede recetar un medicamento esteroide para protegerlo hasta que la glándula suprarrenal se recupere
- Puede desarrollar presión arterial alta, retener demasiados líquidos y sal o tener bajos los niveles de potasio en sangre. Como resultado de esto, su médico puede recomendar algún cambio en su dieta, como comer menos sal o usar ciertos suplementos
- Las vacunas pueden no funcionar bien durante el tratamiento con Acthar. Hable con su médico sobre las vacunas que son seguras cuando se está en tratamiento con Acthar
- Acthar puede ocultar los síntomas de otras enfermedades. Esto puede hacer que sea más difícil

para su médico hacer un diagnóstico si sucede alguna otra cosa.

- Problemas de estómago o intestinales. Acthar puede aumentar el riesgo de sangrado y úlceras estomacales. Informe a su médico si tiene dolor estomacal, vómitos con sangre, heces oscuras o con sangre, cansancio excesivo, aumento de la sed, dificultad para respirar o aumento de la frecuencia cardíaca

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- El uso de Acthar puede hacer que esté irritable o deprimido. También puede tener cambios en el estado de ánimo o problemas para dormir. Estos efectos son reversibles una vez que se interrumpe el tratamiento con Acthar
- Si tiene otras dolencias, como por ejemplo diabetes o debilidad muscular, puede notar que empeoran
- Usted podría desarrollar ciertas afecciones oculares, como cataratas, glaucoma o daño en el nervio óptico
- Su cuerpo puede desarrollar alergias a Acthar; estas alergias pueden ser graves. Los signos de reacción alérgica incluyen:
 - o Sarpullido y picazón en la piel
 - o Hinchazón de la cara, la lengua, los labios o la garganta
 - o Dificultad para respirar
- Los efectos de Acthar pueden intensificarse cuando se tiene hipotiroidismo o cirrosis hepática
- El uso prolongado de Acthar puede afectar el crecimiento y el desarrollo físico de los niños. Esto puede revertirse cuando Acthar ya no es necesario
- Acthar puede causar osteoporosis (huesos débiles)
- Acthar puede dañar al bebé no nacido. Por lo tanto, informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de Acthar?

Efectos secundarios de Acthar que se reportan con frecuencia son:

- Reacción en el lugar de la inyección
- Insomnio (dificultad para dormir)
- Cansancio, debilidad física y falta de energía
- Dolor de cabeza
- Retención de líquidos
- Azúcar en la sangre alta

Los efectos secundarios más frecuentes durante el tratamiento de los espasmos infantiles (Infantile Spasms, IS) son:

- Mayor riesgo de infecciones
- Presión arterial alta
- Convulsiones
- Irritabilidad
- Fiebre

Estos efectos secundarios también se pueden observar en los adultos y en niños mayores de 2 años. En algunos niños los espasmos infantiles progresan a otras formas de convulsiones y a veces los espasmos infantiles enmascaran dichas convulsiones, que pueden manifestarse al terminar el tratamiento de los espasmos infantiles.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Acthar.

Informe a su médico cualquier efecto secundario que le molesta o que no desaparece. Llame a su médico o farmacéutico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch. También puede reportar los efectos secundarios llamando al 1-800-844-2830.

Consulte la Información de prescripción completa que se adjunta para obtener información importante de seguridad adicional.

Acthar[®] GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

Veamos si Acthar® Gel puede aliviar sus síntomas

Escuche las experiencias de pacientes reales y **pregunte a su médico si Acthar Gel** podría ser adecuado para usted.



Visite [Acthar.com/patient-stories](https://www.acthar.com/patient-stories).

Para el tratamiento de:

- Uveítis
- Conjuntivitis
- Queratitis
- Vasculitis retiniana
- Penfigoide
- Otras afecciones inflamatorias

INFORMACIÓN IMPORTANTE ESPECÍFICA SOBRE LA SEGURIDAD

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de Acthar?

Efectos secundarios de Acthar que se reportan con frecuencia son:

- Reacción en el lugar de la inyección
- Cansancio, debilidad física y falta de energía
- Retención de líquidos
- Insomnio (dificultad para dormir)
- Dolor de cabeza
- Azúcar en la sangre alta

Consulte la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción completa que se adjunta.

Mallinckrodt, la marca comercial "M", SelfJect, y el logotipo de Mallinckrodt Pharmaceuticals son marcas comerciales de una compañía de Mallinckrodt. El resto de las marcas son marcas comerciales de una compañía de Mallinckrodt o de sus respectivos propietarios.

© 2025 Mallinckrodt. US-2500445 09/25



Acthar® GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL